

ДО БІОЛОГІЇ КРУКА НА РІВНЕНЩИНІ
В.О.Новак

За час орнітологічних досліджень у Рівненській обл. /1979-91 роки/, зібрано матеріали по поширенню, гніздуванню і особливостях поведінки круків / *Corvus corax* L. /.

Це звичайний, але не чисельний вид, поширений практично по всій території, хоча у лісостеповій частині кількість його більша, ніж на Поліссі. Гніздиться переважно в невеликих лісових масивах. Останніми роками спостерігається деяка синантропізація виду. Так, гнізда в лісах розміщуються часто на віддалі 1-80 м від узлісся / n = 3/, випадки гніздування в невеликих парках і населених пунктах /2/, а також у лісостепах вздовж шоссе /3/. Іх здобувають на скотомогильниках, тваринницьких фермах, рідше - на полях, луках чи в селах. Відмічено випадок успішного полювання крука на курей взимку /с.Надичці Млинівського р-ну/. Під час зимівлі концентруються групами до 30 особин, найчастіше поблизу скотомогильників.

За час проведення досліджень нами зареєстровано 14 гнізд. Найчастіше вони виявлені на дубі /7/, рідше на тополі чорній /осокорі/ /3/, осіці /1/, сосні /1/ і березі /1/. Гнізда знаходились на висоті 7-15, найчастіше - 10 м від землі. окремі будівлі використовуються птахами переважно по 3-4 роки, рідше - понад 10 років. Найбільшу кількість гнізд відмічено в окол. с.Мальована Млинівського р-ну /8/, де щорічно оселяється 5-6 пар у навколишніх лісах.

Круки займають старі гнізда, чи будуєть нові, в середині літнього, а кладка з'являється лише в кінці березня. У середині квітня в гніздах вже є пташенята, які піднімаються на крило в першій декаді травня. Найчастіше у виводках спостерігається 3-4 пташенят, зрідка - 6 /04.05.1991 р. в окол. м.Дубровиця/. Вже в червні самі розпадаються і лише в зимовий період птахи збиратимуться у загри. Цікавим є випадок великої скученості /близько 70 особин/ круків 03.04.1991 р., серед вологих лук на берегах безіменної річки в окол. с.Бараня Червоноармійського р-ну. Причину такого явища важко пояснити, оскільки в більшості пар саме в цей час іде насиджування кладок.

Є в нас дані про конкуренцію за гнізда між круком і звичайним канюком /*Buteo buteo* /L.//, де перевага була на боці канюка. Крім того, випадок гніздування крука в колонії граків /*Corvus frugilegus* L. / очевидно мав негативний вплив - вони й залишили.

Станом на кінець 1991 р. гнізда крука нами знайдені в Млинівському /9/, Дубнівському /3/, Червоноармійському /1/ і Гощанському /1/ районах.

To the biology of the Raven in the Rivne Region. - V.O. Novak. - Data about 14 nests which were collected in 1979-1991 are represented.

Адреса автора: Україна / Ukraine /, 265141, Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Новоукраїнка, Новак В.О.