

ПРО МІГРАЦІЮ КУЛИКІВ У ДОЛІНІ РІЧКИ СЕЙМ

В.М.Грищенко

Матеріал зібрано у 1978-91 роках у заплаві Сейму між селами Ка-
мінь, Мутин, Червоний Ранок Кролевецького та Прилуцького району Новомосковського
району Сумської обл. Кількісні обліки проводилися весною на правому березі річки на ділянці заплави площею 4 кв. км між
селами Мутин і Червоний Ранок, восени - в основному на лівому бе-
резі навпроти с. Мутин.

Сейм, найбільш ліва притока Лесни, протікає в широтному нап-
рямку зі сходу на захід. Весною долина річки стає шляхом інтенсив-
ного прольоту на схід багатьох птахів, у тому числі куликів. Мігра-
ція їх починається у другій половині березня з прильотом чайок.
Відразу за ними з'являються чорниші і травники. У кінці березня і
першій половині квітня йде інтенсивний проліт чайок, травників, а
дещо пізніше - і великих веретенників. До середини квітня кількість
цих видів зменшується, а з третьої декади починається друга хвиля
інтенсивної міграції куликів. Основу масу в цей час становлять ту-
рухтани, фіфі та великий уліт. Пік міграції припадає на останні числа квітня - початок травня. До середини травня міграція куликів
практично припиняється, хоча окремі зграї можуть зустрічатися ще
до кінця цього місяця.

Осіння міграція куликів у долині Сейму значно слабша весняної.
Більше з видів не досягає такої чисельності, як весною. Найбільш чи-
セルними є фіфі, великий уліт, чорниш, поодинокі бордичі особини
яких можуть зустрічатися і в червні, та міграція починається лише з
середини липня. Найбільш інтенсивно вона проходить у перші дві дека-
ди серпня і до початку вересня стихає. Деякі види куликів - бекас,
чайка, малій зуйок - тримаються до жовтня.

Усього за 14 років спостережень на прольоті нами зареєстровано
21 вид куликів. З них весною - 19, восени - 15. Їх можна розділити
на такі групи. Весняна міграція. 1. Масові види, чисельність досягає
сотень особин на 1 кв. км заплави, - чайка і турухтан. 2. Багаточи-
セルні види, чисельність досягає десятків особин на 1 кв. км. - фі-
фі, великий уліт, травник, великий веретенник. 3. Регулярно пролітні,
малочисельні види, чисельність не перевищує кількох особин на 1
кв. км. - малій зуйок, чорниш, поручайник, перевізник, дупель, бекас,
вальдшнеп, великий кроншнейп. 4. Нерегулярно пролітні малочисельні
залітні види: золотиста сивка, мородунка, тулес, малій та білохвостий
побережник. Осіння міграція. 1. Регулярно пролітні малочисельні
види: малій зуйок, чорниш, фіфі, великий уліт, травник, перевізник,
малій побережник, бекас, вальдшнеп, великий кроншнейп, великий
веретенник, чайка. 2. Нерегулярно пролітні малочисельні та залітні
види: тулес, щоголь, чорноволик. Строки весняної міграції II видів
куликів за 10 років наводяться в таблиці.

Тулес / *Ptilialis squatarola* /. З 19 вересня до 24 жовтня
1979 р. невеликі групи до 4 особин та поодинокі птахи трималися на
піщанах косах Сейму та заплавних озерах з мулистими берегами. Тулеси
зустрічалися до самих заморозків та випадання першого снігу. Після
цього ми лише раз зустрічали одинокого птаха II. IV. 1987 р.

Золотиста сивка / *P. apricaria* /. Відмічена на прольоті один
раз: 6.IV.1985 р. спостерігалася зграя близько 50 птахів.

Малій зуйок / *Charadrius dubius* /. Весною з'являється у другій
половині квітня. На весняному перельоті зустрічається переважно
поодинці, і парами. Восени відлітає у другій половині вересня - на по-
чатку жовтня. Найбільш пізня зустріч 3.IX.1982 р.

Таблиця
Строки весняної міграції деяких видів куликів у долині р. Сейм

ВИДИ		1978:	1979:	1980:	1981:	1982:	1983
I. Малій зуйок			II. IV	-	-	26. IV	
2. Чайка	I. VI	22. III	30. III	-	18. III	-	
3. Чорний	-		II. IV	-	II. IV		
4. Філі, приліт	-	18. IV	-	23. IV	23. IV		
5. - " -, кінець прольоту	-	-	22. V	7. V	25. V	12. V	
6. Великий уліт, приліт	-	-	19. IV	-	18. IV	2. V	
7. - " -, кінець прольоту	-	-	19. V	7. V	18. V	5. V	
8. Травник	-	22. III	9. IV	-	-	-	
9. Поручайник	-	-	-	-	2. V	23. IV	
10. Турухтан, приліт	-	-	-	-	20. IV	20. IV	
11. - " -, кінець прольоту	-	-	20. V	-	17. V	5. V	
12. Бекас	-	-	17. IV	-	31. III	26. III	
13. Вальдшнеп	5. IV	-	8. IV	-	-	-	
14. Великий веретенник	-	28. III	12. IV	4. IV	1. IV	26. III	

Закінчення таблиці

ВИДИ: I984: I985: I986: I987: п	середня дата	крайні дати
I. 19. IV	-	II. IV - 26. IV
2. -	20. III	16. III - 30. III
3. I. IV	21. III	21. III - II. IV
4. 18. IV	5. IV	21. IV - 23. IV
5. -	-	17. V - 25. V
6. 14. IV	-	18. IV - 20. IV
7. -	-	12. V - 19. V
8. -	5. IV	2. V - 22. III
9. 10. IV	-	18. IV - 23. IV
10. 13. IV	25. IV	13. IV - 25. IV
11. 10. V	-	5. V - 20. V
12. -	-	6. IV - 17. IV
13. -	5. IV	3. IV - 26. III
14. -	8. IV	5. IV - 8. IV
	15. IV	26. III - 15. IV

Чайка / *Vanellus vanellus* /. Один з найбільш чисельних видів куликів на весняному прольоті. Прилітає у другій половині березня. У кінці березня - перші декади квітня іде інтенсивний проліт у заплаві ще не годуються та відпочивають великі зграї. Чисельність чайок під час масового перельоту досягає 400-600 особин на I км. км заплави. У другій декаді квітня інтенсивність прольоту слабшає! в третій - припиняється, та окрім згрейки можуть зустрічатися ще й на початку травня. Нерідко трапляються на луках разом з шпаками / *Sturnus vulgaris* / та травниками. У пролітніх зграях нарахувалася від 6 до 120 особин, в середньому 35,4 / п = 25 %. Наприкінці прольоту: Сх - 41,9%, ПнСх - 32,3%, ПдСх - 12,9%, ПнЗх, Зх, ПдЗх і Пш - по 3,2% / п = 31/. Летять на висоті до 100 м.

На осінньому перельоті чайка зустрічається в навесік! кількості. У згрейках нараховується від 10 до 200 особин, зустрічаються також групи із кількох чайок. Пролітні зграї спостерігаються з липня до

кіння жовтня. У 1979 р. останніх чайок ми відмітили 26.X. Звичайно, за весь період осінньої міграції пролітає всього кілька зграй цього виду.

Чорниш / *Tringa ochropus* /. Весною прилітає в кінці березня перших числах квітня. Проліт закінчується у другій половині квітня. Осіння міграція триває з другої половини липня по першу декаду вересня. І весною, і восени зустрічається поодинці, парами і групами до 5 птахів. У серпні чисельність чорниша становить 0,1-1,0 особин на 1 кв. км.

Фіфі / *T. glareola* /. Весною прилітає у другій половині квітня. Проліт триває до середини травня, іноді по його третьої декаді. Чисельність у заплавах під час масового перельоту становить 10-30 особин на 1 кв. км, та іноді під час п'їків вона може збільшуватись до 100 і більше особин на 1 кв. км. На весняному прольоті тримається зграями від 5-10 до 50 птахів, трапляються і поодиноки кулики. Восени з'являється ще в другій половині липня, закінчується переліт у третій декаді серпня. Чисельність від 1,0 до 4,0 особин на 1 кв. км. Восени фіфі тримається поодинці, парами і групами до 10 особин. Останніх птахів ми спостерігали 24.VII.1982 р., 24.VIII.1982 р., 22.III.1989 р.

Великий уліт / *T. nebularia* /. Весною прилітає у другій половині квітня. Проліт триває до другої декади травня. Чисельність у заплавах під час масового перельоту становить від 5 до 30 особин на 1 кв. км. Весною тримається поодинці та зграjkами по 2-3 птахів. окрім бродячих уліт трапляються протягом всього літа. Останній переліт починається у другій половині липня, закінчується у кінці серпня - першій половині вересня. Чисельність у серпні 0,2-2,0 особин на 1 кв. км. Восени тримається поодинці і групами до кількох птахів. Останніх улітів ми спостерігали 15.IX.1985 р., 8.IX. 1989 р.

Травник / *T. totanus* /. Весняний прольот триває з кінця березня - початку квітня до другої половини останнього місяця. Тримається зграjkами часто серед чайок. Зграjки до 10 особин зустрічаються на протязі всього літа, у липні число їх збільшується. Восени міграції травники закінчують досить рано, звичайно, у першій половині серпня іноді відлітають ще в кінці липня. Найбільш пізня зустріч 19.VII.1979 р. Останні травники відмічені також 5.VIII.1986 р. і 2.VIII.1991 р.

Шоголь / *T. erythropus* /. Відмічений лише один раз: 29.VIII. 1983 р. один птах на лічному озері.

Поручайник / *T. stagnatilis* /. Прилітає у другій половині квітня, проліт закінчується у другій декаді травня. Чисельність під час масового перельоту 1,0-3,0 особин на 1 кв. км. На осінньому перельоті на ми не відмічений.

Перевізник / *Actitis hypoleucos* /. Прилітає в кінці квітня. Тримається юніці і парами. Останній переліт проходить у серпні - першій половині вересня. Найбільш пізня зустріч 15.IX.1985 р.

Мородунка / *Xenus cinereus* /. Відмічена на прольоті один раз: 11.V.1983 р. у заплаві Сейму спостерігались 3 птахи.

Турухтан / *Philomachus pugnax* /. Весною один з найбільш чисельних куликів. Проліт починається у другій половині квітня, закінчується у другій декаді травня. Турухтани тримаються зграjками із сотень птахів, нерідко більше тисяч, по берегах заплавних водойм. У кінці квітня - на початку травня чисельність досягає 400-600 особин на 1 кв. км. На осінньому прольоті на ми не спостерігався.

Малій побережник / *Calidris minuta* /. Весною прилітає в травні. У 1982 р. міграція почалася 13.V. Тримається зграjkами по

10-20 особин. Осіння міграція з другої декади серпня до кінця вересня - початку жовтня. У 1981 р. проліт почався 10.УН.

Білохвостий побережник / *C. temminckii* /. Лосовірно відмічений лише один раз - 15.У. 1983 р., однак, можливо зустрічається у зграях малих побережників і частіше.

Чорноволик / *C. alpina* /. Відмічений один раз: 1.А. 1980 р. один птах у зграї малих побережників.

Дупель / *Gallinago media* /. Прилітає в квітні. Лосить рідкісний, особливо останніми роками. Восени намі не відмічений.

Бекас / *G. gallinago* /. Весною прилітає в кінці березня - першій половині квітня. Тримається поодинці. Восени зустрічається до жовтня.

Вальдшнеп / *Scolopax rusticola* /. Весною прилітає у першій декаді квітня. Восени відлітає в середині жовтня. Останні птахи спостерігалися 13.Х. 1979 р. і 20.Х. 1984 р.

Великий кроншнеп / *Lymenius arquata* /. Лосить рідкісний на весняному прольоті птах, восени зустрічається частіше. Прилітає в квітні, осінній переліт проходить з третьої декади липня по першій половині вересня. Весною кроншнепи летять на схід, восени на південний захід. У зграях від декількох до 36 птахів.

Великий веретенник / *Limosa limosa* /. Ранній проліт триває з кінця березня - першої декади квітня до кінця квітня - початку травня. Зустрічається зграjkами до 20 особин і поодинці. Восени відлітає досить рано: у третій декаді липня - першій декаді серпня. Останні птахи спостерігалися 5.УН. 1981 р., 30.УП. 1986 р., 1.28.УП. 1991 р.

On the Wader migrations in river Seym valley. - V.N. Grishchenko. - The migrations of the Waders were studied in Sumy Region in 1978 - 1991. 21 species were registered, 19 - in spring and 15 - in autumn. The most numerous Wader species are in spring the Lapwing and the Ruff, in autumn - the Wood Sandpiper and the Greenshenk. The migration terms are indicated.

Адреса автора: Україна / Ukraine /, 25870, Черкаська обл., м. Канів, Канівський заповідник, Грищенко В.Н.