

ПЕРШИЙ ВИПАДОК ЗИМІВЛІ ЧАПЛІ СІРОЇ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ. 02.02.1992 р., при обстеженні очеретяних заростей Драницького орнітологічного заказника (с.Драниця, Новоселіцький р-н), на льоду озера виявлені сліди чаплі сірої /*Ardea cinerea* L. / . Деякі з них були зовсім свіжими, інші - 2-3-денної давності. Виходячи з густоти слідів можна припустити, що вони належали декільком птахам, принаймні 1-3. Знаходити їх чаплям теж було неважко. Справа в тому, що на озері жителі прилеглих сіл у льоду вирубували великі квадратні ополонки і ловили рибу ручними підйомними сітками- "фатками", після чого збирали лише найкрупнішу здобич. Дрібні рибини залишалися на льоду і саме вони ставали легкою поживою для птахів. Також неподалік протікає Прут, водна поверхня якого практично не замерзала повністю протягом зимового періоду 1991-92 рр. і на цій річці теж можна було знайти чаплям їх. П.П.Дзюбак, Д.С.Федорча, Б.И.Годованець, І.В.Скільський.

The first case of the Gray Heron wintering in the Chernivtsi Region. - P.P. Dzyubak, D.S. Fedorchak, B.Y. Godovanets, I.V. Skilsky. - 2.02.1992 were found the scents of this bird on the lake near the village Dranitsa (Novoselitsa District).

Адреса автора: Україна / Ukraine /, 283644, Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Гермаківка, Дзюбак П.П.