

СИНИЦЯ ВУСАТА НА ВОЛИНІ. Регулярно спостерігається в регіоні з 1987 р. Вид, очевидно, проник з півдня по ріках Дніпро-Прип'ять-Стира і далі по їх притоках. Веде в основному осілий спосіб життя, проте весною здійснює кочування-розселення вздовж малих річок, прилеглих ставків і каналів. Синиця вусатах *Panurus biarmicus L.* бачили переважно на території Луцького р-ну: 14.02.1987 р., 06.02.1988 р. - в м.Луцьку, 01.1989 р. - с.Рокині, с.Полонка, 06-07.1990-91 рр. в с.Чаруків-с.Несвіч спостерігали по 2-3 выводки /5-7 пташенят/. 01.02.1991 р. виявлено 11 ос. виду на оз. Луки Любомльського р-ну. Чисельність зростає. Ілляко, що синиця вусата заселяє, в основному, ставки (рідше озера та малі річки) з густими заростями очерету, рогозу, де переважно і тримається у всі пори року. М.В.Химін.

The Bearded Tit in the Volynia. - M.V. Khimin. - The records in winter period 1987 - 1989 and in 1991 on the territory of the Lutsk and Luboml Districts are represented. Near the villages Charukiv and Nesvich were observed yearly 2-3 broods in 5-7 nestlings in 1990 - 1991.

Адреса автора: Україна /Ukraine/, 26310, м.Луцьк, пр.  
Волі, 56/28, Химін М.В.