

ГНІЗДУВАННЯ СИЗОГО МАРТИНА ВІЛЯ КАНЕВА. На Канівському водосховищі сизий мартин (*Larus calvus*) належить до рідкісних гніздових птахів. Відомі лише поодинокі знахідки його гнізд. Так 4.07 1978 р. 4 пташини двох пар було знайдено на одному з острівців у південній частині водосховища /Клестов Н.Л., Фесенко Г.Б. Чайковські птаці водохранилищ Дніпровського каскада. Київ. Ін-т зоології АН УРСР. Препринт 90.3. 1990. 50с./.. У 1992 р. одна пара загніздилася у колонії сріблястого мартина (*Larus argentatus*) на хвилерізі Канівської ГЕС.

М.Н. Гаврилюк, В.М. Грищенко

Common Gull nesting near Kanev. - M.N. Gavrilyuk, V.N. Grishchenko. - A pair of the Common Gull nested in the Herring Gull colony on the Dnieper near Kanev (Cherkassy Region) in 1992.

Адреса автора: 258300, Черкаська обл., Україна (Ukraine), м. Канів, вул. Шевченка, 47, кв. 201.
М.Н. Гаврилюк.

ДО ПОШІРЕННЯ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ЧАПЛИ НА ПОЛТАВЩИНІ. Ще у 20-х роках нинішнього століття велика біла чапля (*Egretta alba*) вважалася рідкісним випадковим залітним птахом. Вона спостерігалася майже виключно весною і головним чином у південних районах області - на Орелі і у нижній течії Псла /Лавриленко Н.И. Птиці Полтавщини. Полтава. 1929. 133 с./.. В останні десятиліття цей вид став досить звичайним у Полтавській області. Строки прильоту для долини р. Сухий Клягантик /Глобинський район/: 9.04 1978, 7.04 1979, 30.03 1980, 27.03 1981, 22.03 1982, 31.03 1983, 27.03 1984, 6.04 1985, 22.03 1986, 3.04 1987, 3.04 1988, 10.03 1989, 26.02 1990, 16.03 1991, 22.03 1992. Середня дата прильоту - 28.03. Восени найпізніші спостереження 5.10.1986 і 9.10.1987. Велика біла чапля досить численна влітку на ставках Полтавського рибоспу біля сіл Броварки, Бугайівка, Святилівка Глобинського району. Відомі випадки гніздування окремих пар у колоніях сірої чапли (*Ardea cinerea*). Так у 1986 р. у колонії між селами Бугайівка та Святилівка було нараховано 18 гнізд, з них 3 займала велика біла чапля. Збудовані вони були на заламах очерету. У зв'язку з частими господарськими роботами на ставках /осушування, скошування рослинності і т.п./ розташування колоній чапель не постійне. Вони ніби "мігрують" по навколишніх придатних місцях.

Ю.Ф. Роговий

To the Great White Egret distribution in the Poltava Region. - Yu.F. Rogovoy. - In the last decades became this bird an usual species. The arrival and departure terms are presented. The Great White Egret nests in the Globino District in the Gray Heron colonies.

Адреса автора: 315964, Україна (Ukraine)
Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Пирогов, Роговий Ю.Ф.