

СПОЖИВАННЯ ВОДИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗИМОВИХ ЗГРАЙ СИНИЦЬ. Трофічні зв'язки птахів, зокрема зимуючих, не обмежуються рослинною /насіння та плоди/ і тваринною /комахи/ іжею. Довготривалі спостереження за представниками зимових зграї синиць /1985-91 рр./ на Волинському Поліссі показали, що до харчового раціону входить і вода. Споживання води зареєстровано у 2 видів - королика жовтоголового, /*Regulus regulus* L./ і гаїчки болотяної /*Parus palustris* L./, які входять до складу зимових зграї синиць. Хоча це явище є рідкісним /всього відмічено 2 випадки споживання води/, проте воно викликає цікавість з точки зору фізіологічного стану та потреб птахів. Характер споживання води та поведінка птахів при цьому були слідуючими. Королики жовтоголові пили воду з меліоративного каналу, який не покрився льодом і знаходився в безпосередній близькості від основного зимового біотопу виду /основи насадження/. При цьому птахи споживали воду в стані польоту, тріпочучи на місці крильми близько 15 хвилин. Гаїчки болотяні в значній кількості подали сніг, що знаходився на різних виступах стовбурів сосни. У першому випадку споживання води спостерігалось в другій половині дня перед відльотом птахів на нічівлю, в другому - близько опівдні. В.І.Шкаран.

The water consumption by birds in the winter Tit flocs. - V.I. Shkaran. - The observations in 1985 - 1991 in Volynia Region shown the use of water by the Goldcrest and the Marsh Tit.

Адреса автора: Україна / Ukraine /, 264648, Волинська обл., Любомльський р-н, сан. Лісова пісня, об'єднання ЛІУ, Шкаран В.І.