

ДО ПОШИРЕННЯ ГОЛУБА-СІНЯКА У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Нині голуб-сіняк (*Columba oenas*) зустрічається на Київщині лише спорадично. Місця гніздування його пов'язані, в основному, з ділянками старих лісів. Більш-менш звичайний цей птах лише у північних районах області. Так у Поліському районі його гніздування було виявлене нами у 1985 р. на території Більчанського, Іковецького, Грезельського та Радинського лісництв. 1-3.05 1987 р. токуєчих самців ми спостерігали у Поташнянському та Блідичнському лісництвах /Бородянский район/. 9.04 1988 р. воркування двох самців було відмічене у Київському лісництві /Бориспільський район/. 13.04 1990 р. синяки виявлені у Кам'янському лісництві /Вишгородський район/. 5.05 1992 р. воркування одного самця було відмічене біля с. Сувід Вишгородського району. У південній половині області синяки в гніздовий період не спостерігалися нами ні разу, хоча подекуди ще збереглися придатні для гніздування місця.

В.М. Грищенко

To the Stock Dove distribution in the Kiev Region. - V.N. Grishchenko. - This is the rare and sporadic distributed bird species. Some nesting records are presented.

Адреса автора: Україна, 258300 (Ukraine),
Черкаська обл., м. Камів,
Камівський заповідник,
Грищенко В.М.

ВИПАДОК НЕЗВИЧАЙНОГО ГНІЗДУВАННЯ ГОРИХВІСТКИ ЧОРНОЇ. 02.06.1982 р. проводилося орнітофауністичне обстеження долини невеличкої річки - притоки Прута /окраїна с. Трач, Косівський р-н, Івано-Франківська обл./. У середньої глибини ярузі, неподалік від води в заростях кропиви, виявлено гніздо горихвісток чорних /*Phoenicurus ochruvus* /
Воно краями було прикріплене до нижньої частини стебел 5-ти рослини на висоті 40 см від землі. В гнізді знаходилися четверо 1-2-денних пташенят. Цікаво зазначити, що неподалік /близько 100 м/ знаходилося житло людини і там, під дахом будинку, гніздилися ще одна пара горихвісток чорних - птахи час від часу носили їжу добре опереним пташеняттам. І.В.Скільський.

The unusual nesting case of the Black Redstart. - I.V. Skilsky. - 2.06 1982 near the village Trach (Ivano-Frankivsk Region, Kossiv District) was found a nest on the nettle stalks.

Адреса автора: Україна / Ukraine /, 274001, м.Чернівці, вул. Буковинська, 9/4, Скільський І.В.

ПРО ЗАЛІТ КОСАРА В РІВНЕНСЬКУ ОБЛАСТЬ. 05.03.1990 р. 1 ос. спостерігали разом з 5 сірими чаплями /*Aldea cinerea* L. / в окол. с. Мельована Млинівського р-ну /М.О.Новак, усне повідомлення/. Птахи летіли косою шеренгою в північно-західному напрямку на висоті 80 м долаючи опір сильного зустрічного вітру, який їх постійно зносив на північ. Косар /*Platalea leucorodia* L. / повопився як різноправний член зграї час від часу очолюючи шеренгу. Це перший випадок заліту виду в Рівненську обл., яка знаходиться за 600 км від найближчого місця гніздування. В.О.Новак.

About the record of the Spoonbill in Rivn Region. - V.O. Novak. - A bird was observed at first for the region 5.03 1990.

Адреса автора: Україна /Ukraine /, 281470, Хмельницька обл., Летичівський р-н, с.Голосків, вул. Миру, 26/2, Новак В.О.