



ет отметить вяхиря, 5 гнезд его были обнаружены на расстоянии от 7 до 35 м от гнезд пустельги, ушастую сову (*Asio otus*) – 2 случая гнездования на расстоянии 18 и 45 м, полевого воробья – 2 постройки на крыше гнезда, 4 – в стенках и 1 – в основании.

3. В верховьях Кучурганского водохранилища у с. Павловка 4.05.1998 г. найдено гнездо болотного луня (*Circus aeruginosus*). Оно располагалось в старом густом тростнике высотой около 3 м, в 30 м от берега. Постройка в виде плоской платформы упиралась в стебли тростника на высоте 95 см от воды, глубина в этом месте была 20-25 см. В гнезде находилось 4 слабонасижен-

ных яйца. При подходе на расстояние 3-4 метра с гнезда слетела самка луня, а из-под основания его выскочил пастушок (*Rallus aquaticus*). Оказалось, что в переплетении осоки, тростника и веток, падавших с гнезда луней, было свежестроенное гнездо пастушка, расположенное на уровне воды. Пара пастушков держались поблизости в 6-10 м, постоянно перемещаясь и издавая различные звуки.

Украина (Ukraine),
273414, Одесская обл.,
Раздельнянский р-н, с. Кучурган.
А.М. Архипов.

Замітки	Беркут	8	Вип. 1	1999	117
---------	--------	---	--------	------	-----

ЗНАХІДКА СИПУХИ В ОКОЛИЦЯХ ЗАПОВІДНИКА “МЕДОБОРИ”

Record of the Barn Owl in environs of the Nature Reserve “Medobory”. - Ya.I. Kapelyukh. - **Berkut. 8 (1). 1999.** - A dead bird was found in the town Grymayliv (Ternopil region, 49.20 N, 26.01 E) 18.12.1998. Probably Barn Owls nest in ruins of a synagogue.

18.12.1998 р. в одному з господарських дворів смт Гримайлів була знайдена мертва сипуха (*Tyto alba*). Птах загинув від виснаження, поверхня землі в цей час була покрита шаром снігу до 50 см та почалися сильні морози (-18-20 °C). Двір, у якому знайдено птаха, знаходиться недалеко від розвалин синагоги, де ці сови, ймовірно, гніздяться. Це перша зустріч сипухи у даному районі.



Я.І. Капелюх


Україна (Ukraine), 283270,
Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н,
смт Гримайлів.

Заповідник “Медобори”. Я.І. Капелюх.

ЗУСТРІЧ ХОДУЛИЧНИКІВ НА КАНІВЩИНІ

Record of Black-winged Stilts in Kaniv district. - V.N. Grishchenko. - **Berkut. 8 (1). 1999.** - 21.04.1999 4 birds were observed on flood-plains of the Ros river near the village of Khutir-Khmilna (Cherkasy region, 49.40 N, 31.32 E). It is the first record in this area since 1844.

21.04.1999 р. 4 ходуличники (*Himantopus himantopus*) спостерігалися в заплаві р. Рось поблизу від с. Хутір-Хмільна (Канівський р-н Черкаської обл.). Вони годувалися на мілководді на затоплених повінню луках разом з іншими куликами – фіфі (*Tringa glareola*), великими улітами (*T. nebularia*), травниками (*T. totanus*). Це перше спостереження ходуличників у районі за останні півтора століття. К.Ф. Кеслер відмітив 3 дорослих птахів в околицях м. Канева 8.07.1844 р. (нов. ст.) (Орлов, 1948).



В.М. Грищенко

Україна (Ukraine),
19000, Черкаська обл., м. Канів,
Канівський заповідник.
В.М. Грищенко.