



- Prather J.W., Cruz A. (1995): Breeding biology of Florida Prairie Warblers and Cuban Yellow Warblers. - Wilson Bull. 107: 475-484.
- Rahn H., Ar A. (1974): The avian egg: incubation time and water loss. - Condor. 76: 147-152.
- Rahn H., Paganelli C.V., Ar A. (1975): Relation of avian egg weight to body weight. - Auk. 92: 750-765.

- Sethi V.K., Bhatt D. (2008): Call repertoire of an endemic avian species, the Indian Chat *Cercomela fusca*. - Curr. Sci. 94: 1173-1179.
- White L.S. (1919): Nesting habits of the Brown Rockchat *Cercomela fusca*. - J. Bombay Nat. Hist. Soc. 26: 667-668.
- Zar J.H. (1999): Biostatistical Analysis. New Jersey: Prentice-Hall.

Замітки	Беркут	19	Вип. 1-2	2010	152
---------	--------	----	----------	------	-----

## НОВА ЗНАХІДКА ВЕЛИКОГО КРОХАЛЯ В КАРПАТАХ

**New record of the Goosander in the Carpathians. - V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko. - Berkut. 19 (1-2).** - Goosander is a very rare breeding species in West Ukraine. A female with 5 chicks were observed on the Rika river near the village of Vuchkove [48.27 N, 23.33 E] on 16.06.2010. [Ukrainian].

Великий крохаль (*Mergus merganser*) – в Україні досить звичайний вид під час міграцій і на зимівлі, на гніздуванні ж зустрічається вкрай рідко і лише в західних областях. В Українських Карпатах його виявляли на гніздуванні всього кілька разів. 1.05.1926 р. на р. Уж біля с. Сторожниця (нині Ужгородський р-н) на Закарпатті була здобута пара, самка з якої вже почала насиджування яєць (Грабар, 1997). А.М.



Виводок великого крохалю. Ріка біля с. Вучкове. 16.06.2010 р. Фото В.М. Грищенка. A brood of the Goosander on the Rika river.

Полуда (1991) виявив гніздове угруповання великих крохалів у районі Вільшанського водосховища на р. Тербля в Закарпатській обл. 16.07.1987 р. тут спостерігався виводок з 13 пташенят і самки. В.В. Бучко (1998) знайшов цей вид на гніздуванні в Передкарпатті – в 1986 р. самка, яка насиджувала кладку, виявлена на р. Лімниця поблизу с. Блюдниги Галицького р-ну Івано-Франківської обл.

16.06.2010 р. на Ріці біля с. Вучкове Міжгірського р-ну Закарпатської обл. нами спостерігався виводок із 5 пташенят і самки (фото). Птахи трималися серед каміння біля берегів річки. Це місце знаходиться неподалік від водойми, на якій крохалі були виявлені раніше. Очевидно, в центральній частині Українських Карпат існує постійний осередок гніздування цього виду.

## ЛІТЕРАТУРА

- Бучко В.В. (1998): Птахи Галицького регіонального ландшафтного парку та його околиць. Повідомлення 1. Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes. - Запов. справа в Україні. 4 (2): 32-41.
- Грабар А. (1997): Птицы Подкарпатской Руси (Avifauna Carpathorossica). - Беркут. 6 (1-2): 91-102.
- Полуда А.М. (1991): Гнездование большого крохалю (*Mergus merganser*) в Карпатах. - Вестн. зоол. 2: 85.

**В.М. Грищенко,  
Є.Д. Яблонівська-Грищенко**

Канівський заповідник, м. Канів,  
19000, Черкаська обл.,  
Україна (Ukraine).  
E-mail: vgrishchenko@mail.ru.